

Bisoprolol

| 商品名 | 中文商品名 | 含量 |
|------|--------|-----|
| Biso | 百適歐膜衣錠 | 5毫克 |

作用：此藥用於治療高血壓、心律不整、或心臟衰竭。

使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 曾經對此藥有過敏反應者。
2. 打算懷孕、已懷孕超過12周或哺乳者。
3. 若您患有肺臟、腎臟或肝臟疾病、血液循環問題、精神疾患、重症肌無力或重度心臟衰竭或心動過緩且未安裝心律調節器。

正確服藥及儲存方法：

1. 可與食物或不與食物一起服用。若引起肚子不舒服則與食物一起服用。為了獲得最佳療效，請勿忘記定時吃藥。
2. 忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可服用兩倍劑量。
3. 改變劑量或停藥前請和醫師討論。
4. 服藥期間請配合醫師建議的飲食和運動計畫。
5. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

注意事項：

1. 服藥期間請經常檢查您的血糖、血壓和心跳。
2. 避免飲酒（包括葡萄酒、啤酒和白酒）。
3. 請勿突然停藥。若停藥，胸口會比以往疼痛，有時甚至會引發心臟病。
4. 若您正服用此藥並有高血壓，在使用可能引起血壓升高的非處方藥前，請先詢問醫師。
5. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
6. 坐姿或躺姿幾分鐘後應非常緩慢地站起。爬樓梯時須小心。

可能發生之副作用：

1. 感覺頭痛、頭暈、想睡、視力模糊或不能清楚地思考。
2. 性能力改變。

若您有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 過敏反應的症狀如出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、難以呼吸或說話、嗓音異常嘶啞或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
2. 抑鬱、自殺想法、精神緊張、情緒大起大落、異常思維、焦慮或者對生活喪失興趣的體徵或症狀。
3. 嚴重眩暈或失去知覺。
4. 呼吸困難。
5. 感覺極為乏力或虛弱。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期，以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部 謹製

服務電話：3422121-76111、76114(門診藥局)
3422121-76104(藥物資訊中心)

202307增修