

Diazepam

商品名	中文商品名	含量
Vanconin	煩可寧錠	2毫克

作用：此藥用於鬆弛肌肉、預防和控制癲癇發作、戒酒、治療焦慮症或恐慌症發作。

使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 曾經對此藥有過敏反應者。
2. 打算懷孕、已懷孕或哺乳者。
3. 青光眼、重症肌無力、嚴重肝、肺、腎臟疾病或睡眠呼吸暫停。

正確服藥及儲存方法：

1. 隨食物服用此藥。
2. 忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可服用兩倍劑量。
3. 改變劑量或停藥前請和醫師討論。
4. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。
5. 連續服用一段期間之後請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀，如焦慮、睡不著、易發怒。

注意事項：

1. 此藥長期使用可能會有成癮的現象。
2. 避免飲酒（包括葡萄酒、啤酒和烈酒）或避免服用其他可能減緩您動作和反應的藥物。
3. 避免駕駛或進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。

可能發生之副作用：

1. 感覺頭昏眼花、想睡、視力模糊或不能清楚地思考。
2. 感覺疲倦或虛弱。
3. 口乾。良好的口腔護理、用力吸吮、嚼無糖硬糖塊、或咀嚼無糖口香糖可能會有所

幫助。經常看口腔科醫生。

4. 平衡感改變。

若您有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 過敏反應的症狀如出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、難以呼吸或說話、嗓音異常嘶啞或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
2. 在清晰思維和符合邏輯思維方面發生顯著改變。
3. 平衡嚴重改變。
4. 感覺極為乏力或虛弱。
5. 若開始用此藥後癲癇發作情況加重或有所改變。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期、以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部 謹製

服務電話：3422121-76111、76114(門診藥局)
3422121-76104(藥物資訊中心)

202401審閱