

Silymarin

商品名	中文商品名	含量
Silymarin Cap	賜康保肝膠囊	150毫克

作用：此藥當作慢性肝病、肝硬變及脂肪肝之佐藥。

使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 曾經對此藥有過敏反應者。
2. 打算懷孕、已懷孕或哺乳者。

正確服藥及儲存方法：

1. 每日相同時間服用此藥。飯前或飯後服用均可。若引起肚子不舒服則與食物一起服用。
2. 忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可服用兩倍劑量。
3. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

注意事項：

1. 若就診其他醫師，需告知您正在使用此藥。
2. 服藥期間請配合醫師指示定期檢查抽血檢查。
3. 服藥期間避免飲酒包括葡萄酒、啤酒或含酒精的混合飲料。

可能發生之副作用：

1. 噁心、嘔吐。
2. 腹部膨脹感。
3. 輕瀉或利尿。

若您有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 懷疑藥物服用過量中毒。
2. 過敏反應的症狀如出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、難以呼吸或說話、嗓音異常嘶啞或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
3. 任何皮疹。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期、以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部 謹製

服務電話： 3422121-6111、6114(門診藥局)
3422121-6104(藥物資訊中心)

201507修訂