

Medroxyprogesterone

商品名	中文商品名	含量
Provera	普維拉錠	5 毫克

作用：黃體素製劑。

使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：

1. 曾經對此藥有過敏反應者。
2. 若您患有糖尿病、出血性疾病；血液凝塊或有血液凝塊的風險；乳癌；子宮癌、卵巢癌、子宮頸癌或陰道癌；肝臟疾病；近期曾心臟病發作；近期曾中風；雌激素（雌性素）或黃體素促發之腫瘤；或不明原因的陰道出血。
3. 打算懷孕、已懷孕或哺乳者。

正確服藥及儲存方法：

1. 飯前或飯後服用均可。若引起肚子不舒服則與食物一起服用。為獲得最佳療效，請每天固定時間服藥。
2. 忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可服用兩倍劑量。
3. 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

注意事項：

1. 若就診其他醫師，需告知您正在使用此藥。
2. 請經常檢查您的血壓。
3. 進行骨質密度檢測。並請配合醫師指示服用鈣補充劑及維他命 D 補充劑。
4. 定期乳房檢查（每月自檢）及每年婦科檢查非常重要。
5. 此藥可能會讓您臉部的皮膚出現暗斑。避免日曬、太陽燈及日曬床。使用防曬乳液並穿防曬的衣物和太陽眼鏡。
6. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。

可能發生之副作用：

1. 體重增加。頭痛。眩暈。噁心或嘔吐。腹脹感。性欲降低。青春痘。感覺疲倦或虛弱。乳房增大。陰道出血或斑點。腹痛。腿抽筋。水腫。

若您服藥後有下列任一症狀，請立即就醫：

1. 懷疑藥物服用過量中毒。
2. 過敏反應的症狀如出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、難以呼吸或說話、嗓音異常嘶啞或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
3. 肝臟問題症狀，包括尿色深、感到疲倦、沒有飢餓感、胃部不適或胃部疼痛、糞便顏色不深、嘔吐或者皮膚或眼睛泛黃。
4. 胸痛或胸悶。
5. 咳血。
6. 力量變化(一側強過另一側)、說話或思維困難、平衡改變或者視力模糊。
7. 腿或手臂腫脹、發熱或疼痛。
8. 嚴重頭痛。嚴重噁心或嘔吐。嚴重腹痛。
9. 嚴重眩暈或失去知覺。
10. 眼睛突起。視力改變。
11. 乳房腫塊、乳房脹痛或乳頭溢液。陰道搔癢或分泌物異常。不正常陰道出血。
12. 憂鬱症。情緒改變。
13. 記憶問題或喪失記憶。
14. 手或腳的水腫。

如果您還有其他用藥的問題及副作用，請打電話或當面詢問，告知您的病歷號、聯絡電話、藥袋上藥品名及日期、以便回覆。祝您早日康復。

高雄榮民總醫院藥學部 謹製

服務電話：3422121-76111、76114(門診藥局)

3422121-76104(藥物資訊中心)

202404 審閱